## 入院診療計画書

## 内シャント造設術を受けられる

)様へ

2 部 印 刷 1部:患者ファイル 1部:患者様用

 病名
 年齢
 生年月日:
 薬剤師

 症状
 受持看護師
 病棟
 管理栄養士

<ul> <li>薬</li> <li>基礎後の注意点</li> <li>これから透析をはじめられる方には、今後の食事に対する説明をさせていただきます</li> <li>事術・検査承諾書に署名し、看護師に渡してください</li> <li>これから透析をはじめられる方には、今後の食事に対する説明をさせていただきます</li> <li>基院後の注意点</li> <li>シャント音が聞こえないときや、聞こえが悪いと来受診をしてください。</li> <li>海側部が赤くなったりすれば早めに外来にきてくも、抗生剤の飲み薬はなくなるまで飲んでください。</li> <li>(4) 抗生剤の飲み薬はなくなるまで飲んでください。</li> <li>(5) ( / ) に泌尿器科外来にきてくる。</li> <li>(6) 受診日までは、アルコールは飲まないでください。</li> <li>アルコールを飲むことにより傷がむくみ、痛</li> </ul>		手術前日	手術当日	1日目	2日目
日標 女 手術に対する心配帯や不安なことを話すことができる		月日	月日	月日	月日
食事 手術による食事の中止はありません  動限はありませんが、手術した手に添え木をあてます 朝、添え木を取ります また、手術した手を体に致いたり、強く曲げたままにする 血液の流れが良ければ、シャントを発達させる ためにボールなどを握る運動を始めます また、手術した手を体に致いたり、強く曲げたままにする 血液の流れが良ければ、シャントを発達させる ためにボールなどを握る運動を始めます また。「手術後、接条まで入浴・シャワー浴はできません 「一般のでは、「」」」」  「「一般のでは、」」  「「一般のでは、「一般のでは、「一般のでは、「一般のでは、「一般のでは、「一般のでは、「一般のでは、「一般のでは、「一般のでは、」」」 「「一般のでは、「一般のでは、「一般のでは、「一般のでは、」」」 「「一般のでは、「一般のでは、「一般のでは、」」」 「「一般のでは、」」」 「「一般のでは、」」」 「「一般のでは、」」 「「一般のでは、、」」	目標		☆ 痛いときや調子が悪いときに訴えることができる	☆ 退院後の注意事項や生活が理解できる	
また、手術した手を体に敷いたり、強く曲げたままにする   ためにボールなどを握る運動を始めます   ためにボールなどを握る運動を始めます   ためにボールなどを握る運動を始めます   上海   大参しボールなどを握る運動を始めます   上海   大参しボールなどを握る運動を始めます   手術は   ・	食事				
排泄 制限はありません  治療・処置 患者様の確認のためにリストバンドを足に装着します	安静	自由です	また、手術した手を体に敷いたり、強く曲げたままにする	血液の流れが良ければ、シャントを発達させる	自由です
治療・処置 患者様の確認のためにリストバンドを足に装着します 手術は : からの予定です 毎日シャント部の状態を観察します 現在飲んでいる薬は場合により、中止になることがあります 抗生剤の飲み薬がはじまります(1日間予定)	清潔	入浴・シャワー浴をすることができます	手術後、抜糸まで入浴・シャワー浴はできません		
<ul> <li>治療・処置 患者様の確認のためにリストバンドを足に装着します</li> <li>現在飲んでいる薬は場合により、中止になることがあります 抗生剤の飲み薬がはじまります(1日間予定)</li> <li>医師が検査について説明します</li> <li>されから透析をはじめられる方には、今後の食事に対する説明をさせていただきます</li> <li>教育指導</li> <li>事術・検査承諾書に署名し、看護師に渡してください</li> <li>これから透析をはじめられる方には、今後の食事に対する説明をさせていただきます</li> <li>まが悪いときや、聞こえが悪いと来受診をしてください。</li> <li>が悪いときや、聞こえが悪いと来受診をしてください。</li> <li>が悪いときや、聞こえが悪いと来受診をしてください。</li> <li>が悪いときや、聞こえが悪いと来受診をしてください。</li> <li>が出りの飲み薬はなくるまで飲んでください。</li> <li>「に必尿器科外来にきてくくる。」」に必尿器科外来にきてくくる。</li> <li>「の長齢日までは、アルコールは飲まないでください。」</li> <li>アルコールを飲むことにより傷がむくみ、痛</li> </ul>	排泄	制限はありません			
薬       医師が検査について説明します       退院後の注意点         お育指導       これから透析をはじめられる方には、今後の食事に対する説明をさせていただきます       1. シャント音が聞こえないときや、聞こえが悪いと来受診をしてください。         2. 次回受診日までは創部はそのままにしておいて、3. 創部が赤くなったりすれば早めに外来にきてくが、抗生剤の飲み薬はなくなるまで飲んでください。       4. 抗生剤の飲み薬はなくなるまで飲んでください。         5. ( / ) に泌尿器科外来にきてくがきい。       6. 受診日までは、アルコールは飲まないでください。         これから透析をはじめられる方には、シャント音の確認をして。       アルコールを飲むことにより傷がむくみ、痛	治療∙処置	患者様の確認のためにリストバンドを足に装着します		毎日シャント部の状態を観察します	
数育指導	薬	現在飲んでいる薬は場合により、中止になることがあります	抗生剤の飲み薬がはじまります(1日間予定)		
その他 体重計・血圧計も購入していただきます		手術・検査承諾書に署名し、看護師に渡してください これから透析をはじめられる方には、シャント音の確認をして いただくために、聴診器を購入していただきます	る説明をさせていただきます		<ol> <li>シャント音が聞こえないときや、聞こえが悪いときには外来受診をしてください</li> <li>次回受診日までは創部はそのままにしておいてください</li> <li>創部が赤くなったりすれば早めに外来にきてください</li> <li>抗生剤の飲み薬はなくなるまで飲んでください</li> </ol>
※上記内容は、現時点で考えられるものであり、今後検査等を進めていくにしたがって変わることもありますのでご了承ください ※ご質問等ございましたら気軽にスタッフへ声を掛けてください。 ※ 特別な栄養管理の必要性 □ 有 主治医 取しますのでは著名	※上記内容(			************************************	FI FI

・こ負問寺こさいましたり	ら気軽にスタツノへ声を	:掛けてくたさい。	*	付別は不食自住の必安に		Ή	土冶医	又は署名
◇総合的な機能評価◇	□ 評価対象外	_			<b>√</b>	無	私は、	上記診療行為について、主治医から十分な説明を受けました。
ロエルナチェル	BB BE 4.1							

·口币工冶制IF	□ □ 四起なし	□ 女社迎既余
- 認知機能	□ 問題なし	□ 要経過観察
▶ 意欲	□問題なし	□ 要経過観察