

# 入院診療計画書

縦隔・胸膜腫瘍手術を受けられる

( )様へ

薬剤師

2 部 印刷

1 部 : 患者ファイル

リハビリ担当

1 部 : 患者様用

病名

年齢

生年月日:

症状

受持看護師

病棟

管理栄養士

病日	手術前日	手術当日 (術前)	(術後)	術後1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目	8日目～退院日(12日目目標)		
日付	/ ( )	/	( )	/ ( )	/ ( )	/ ( )	/ ( )	/ ( )	/ ( )	/ ( )	/ ( ) ~ / ( )		
目標	☆安心して手術を受けることができる	☆痛い時や調子の悪い時などに訴えることができる	☆しっかりと体を動かすことができる										
食事	原則として21時以降は食べること ができません(水分は麻酔科医から説明があります)	飲んだり食べたりできません(水分は麻酔科医から説明があります)		朝から飲水できます 昼から全粥食が はじめます	普通食となります (※食事療法が必要な方は、病状に合わせた食事ができます) 食事の形態を変えることができます。希望時、看護師に言って下さい								
安静度	自由です	ベッド上安静で すが寝返りをする ことはできます	ベッド上で自分座 ることができます。ベッド周囲で座る ことができます	ベッドの周囲で立つこと、歩くことができます 胸の管が抜けたら歩くことができます。制限はありません。									
清潔	入浴することができます	入浴をすることできません		胸の管が入っている間は入浴することができません ので、看護師が毎日身体を拭きにまいります	管が抜けると、濡れないテープを貼ってシャワー浴 をすることができます	抜糸翌日から入浴することができます							
検査	血液ガスの検査をします		術後、胸のX線 撮影をします	血液検査と胸のX 線撮影をします	胸のX線撮影を します	血液検査と胸のX 線撮影をします	胸のX線撮影を します	血液検査と胸のX 線撮影をします	血液検査と胸のX 線撮影をします				
治療	リハビリ室にて呼吸リハビリを行 います 持参薬は特に指示がなければ続 けて飲んで下さい ※抗凝固剤(パナルジン・バファリ ン・バイアスピリン・ワーファリン・ プラビックス・プレタールなど)を内 服している方は中止してください	朝、手術着に着替えて点 滴を始めます	点滴・抗生素・酸素 吸入を行います	背中に痛み止めの管が入ります	→ なくなり次第痛み止めの管を抜きます → 術後も引き続き、理学療法士による呼吸リハビリを行います → 傷には透明な創面保護材を貼ります → 医師・看護師が創部の観察に伺います → 胸部に1~2本管が入り、持続吸入をします。肺から空気の漏れがなくなり、排液量が少なくなれば、胸の管をぬきます。 → 飲水・食事が開始となれば内服を再開してください。鎮痛剤の内服が始まります。(抗凝固剤の内服は医師の指示がでれば再開します)								
処置	21時に下剤を内服します 眠剤を希望される場合は看護師 にお知らせ下さい	排便がなければ6~8時に 浣腸をし、手術室で尿の管 を入れます。手術室に入る 予定時間は( )です。 必要な方は、胸と脇の毛剃 りをします。医師からの指示 がある方は弾性ストッキン グをはきます。		尿の管を抜きます ポータブルトイレを使用してください									
説明	主治医・麻酔科医・看護師から説 明があります  同意書は手術当日までに詰所に お出しください  お薬などアレルギー歴がある場合は 医師又は看護師にお知らせください  必要物品 胸帶 1枚 バスタオル 1枚 アテントタイプオムツ 1枚	手術中、家族の方は病 室またはデイルームでお 待ち下さい  主治医から 術後説明があります	痛みがある時は痛み止めをしますので、看護師にお知らせ下さい  私は、上記診療行為について、主治医から十分な説明を受けました。									退院後注意事項について、別紙パンフ レットで説明いたします	
												退院	
												外来受診日決定 ( / )	

※上記内容は、現時点で考えられるものであり、今後検査等を進めていくにしたがって変わることもありますのでご了承ください

※ご質問等ございましたら気軽にスタッフへ声を掛けてください。

◇総合的な機能評価◇  評価対象外

- ・日常生活動作  問題なし  要経過観察
- ・認知機能  問題なし  要経過観察
- ・意欲  問題なし  要経過観察

※ 特別な栄養管理の必要性  有

印  
又は署名

主治医

私は、上記診療行為について、主治医から十分な説明を受けました。

年 月 日 患者 又は 親権者・親族等サイン (続柄 )

高知赤十字病院 外科 06-003-1-P0(患者用)

