

| レジメン名称 | 薬剤名 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1クール日数 |
|---------|--------------|-----------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| mLSG15 | ドキソルビシン | 点滴 | 40mg/m ² | d1 | |
| | ビンクリスチン | 点滴 | 1mg/m ² (MAX 2mg/Body) | d1 | |
| | シクロホスファミド | 点滴 | 350mg/m ² | d1 | |
| | ドキソルビシン | 点滴 | 30mg/m ² | d8 | |
| | ラニムスチニ | 点滴 | 60mg/m ² | d8 | 28日 |
| | ビンデシン | 点滴 | 2.4mg/m ² | d15 | |
| | エトポシド | 点滴 | 100mg/m ² | d15 - 17 | |
| | カルボプラチニ | 点滴 | 250mg/m ² | d15 | |
| A-CHP | プレドニゾロン | 内服 | 40mg/m ² | d1, 8, 15, 16, 17 | |
| | ドキソルビシン | 点滴 | 50mg/m ² | d1 | |
| | シクロホスファミド | 点滴 | 750mg/m ² | d1 | 21日 |
| | ブレンツキシマブベドチニ | 点滴 | 1.8mg/kg | d1 | |
| イストダックス | プレドニゾロン | 内服 | 100mg/Body | d1 - 5 | |
| | ロミデプシン | 点滴 | 14mg/m ² | d1, 8, 15 | 28日 |
| | ジフォルタ | プララトレキサート | 点滴 | 30mg/m ² | d1, 8, 15, 22, 29, 36, |
| ポテリジオ | モガムリズマブ | 点滴 | 1mg/kg | d1 | 7日 |
| CHOP | ドキソルビシン | 点滴 | 50mg/m ² | d1 | |
| | ビンクリスチン | 点滴 | 1.4mg/m ² (MAX 2mg/Body) | d1 | 14日 |
| | シクロホスファミド | 点滴 | 750mg/m ² | d1 | |
| | プレドニゾロン | 内服 | 100mg/Body | d1 - 5 | |
| EPOCH | エトポシド | 点滴 | 50mg/m ² | d1 - 4 | |
| | ドキソルビシン | 点滴 | 10mg/m ² | d1 - 4 | |
| | ビンクリスチン | 点滴 | 0.4mg/m ² | d1 - 4 | 21日 |
| | シクロホスファミド | 点滴 | 750mg/m ² | d5 | |
| | プレドニゾロン | 点滴 | 60mg/m ² | d1 - 5 | |
| GDP | ゲムシタビン | 点滴 | 1000mg/m ² | d1, 8 | |
| | シスプラチニ | 点滴 | 75mg/m ² | d1 | 21日 |
| | デキサメタゾン | 点滴, 内服 | 40mg/Body | d1 | |
| ESHAP | エトポシド | 点滴 | 40mg/m ² | d1 - 4 | |
| | シスプラチニ | 点滴 | 25mg/m ² | d1 - 4 | 21日 |
| | メチルプレドニゾロン | 点滴 | 500mg/Body | d1 - 5 | |
| | シタラビン | 点滴 | 2000mg/m ² | d5 | |
| レミトロ | デニロイキンジフチトクス | 点滴 | 9μg/kg | d1 - 5 | 21日 |