

レジメン名称	薬剤名	投与経路	投与量	投与日	1クール日数
GEM	ゲムシタビン	点滴	1000mg/m ²	d1, 8, 15	28日
GEM + TS-1(q4w)	ゲムシタビン	点滴	1000mg/m ²	d1, 15	28日
	ティーエスワン	内服	80mg/m ² /day	d1 (夕) - d15 (朝)	
GEM + TS-1(q3w)	ゲムシタビン	点滴	1000mg/m ²	d1, 8	21日
	ティーエスワン	内服	80mg/m ² /day	d1 (夕) - d15 (朝)	
GEM + CDDP	ゲムシタビン	点滴	1000mg/m ²	d1, 8	21日
	シスプラチン	点滴	25mg/m ²	d1, 8	
Dur + GEM + CDDP	デュルバルマブ	点滴	1500mg/body	d1	21日
	ゲムシタビン	点滴	1000mg/m ²	d1, 8	
	シスプラチン	点滴	25mg/m ²	d1, 8	
Pembro + GEM + CDDP	ペムブロリズマブ	点滴	200mg/body	d1	21日
	ゲムシタビン	点滴	1000mg/m ²	d1, 8	
	シスプラチン	点滴	25mg/m ²	d1, 8	
CPT-11	イリノテカン	点滴	100mg/m ²	d1, 8, 15	28日
FOLFIRINOX	オキサリプラチン	点滴	85mg/m ²	d1	14日
	レボホリナート	点滴	200mg/m ²	d1	
	イリノテカン	点滴	180mg/m ²	d1	
	フルオロウラシル (急速)	点滴	400mg/m ²	d1	
	フルオロウラシル (持続)	点滴	2400mg/m ²	d1 - 3	
mFOLFIRINOX	オキサリプラチン	点滴	85mg/m ²	d1	14日
	レボホリナート	点滴	200mg/m ²	d1	
	イリノテカン	点滴	150mg/m ²	d1	
	フルオロウラシル (持続)	点滴	2400mg/m ²	d1 - 3	
nal-IRI+5-FU/LV	イリノテカン (リボゾム)	点滴	70mg/m ²	d1	14日
	レボホリナート	点滴	200mg/m ²	d1	
	フルオロウラシル (持続)	点滴	2400mg/m ²	d1 - 3	
GnP	nab-パクリタキセル	点滴	125mg/m ²	d1, 8, 15	28日
	ゲムシタビン	点滴	1000mg/m ²	d1, 8, 15	