

| レジメン名称 | 薬剤名 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1クール日数 |
|------------------|---------------|------|-----------------------|------------|--------|
| Pembro + FP | ペムブロリズマブ | 点滴 | 200mg/Body | d1 | |
| | シスプラチン | 点滴 | 80mg/m ² | d1 | 21日 |
| | フルオロウラシル | 点滴 | 800mg/m ² | d1 - 5 | |
| Nivo (q2w) + FP | ニボルマブ | 点滴 | 240mg/Body | d1, 15 | |
| | シスプラチン | 点滴 | 80mg/m ² | d1 | 28日 |
| | フルオロウラシル | 点滴 | 800mg/m ² | d1 - 5 | |
| Nivo (q4w) + FP | ニボルマブ | 点滴 | 480mg/Body | d1 | |
| | シスプラチン | 点滴 | 80mg/m ² | d1 | 28日 |
| | フルオロウラシル | 点滴 | 800mg/m ² | d1 - 5 | |
| Nivo (q2w) + Ipi | ニボルマブ | 点滴 | 240mg/Body | d1, 15, 29 | |
| | イピリムマブ | 点滴 | 1mg/kg | d1 | 42日 |
| | ニボルマブ | 点滴 | 360mg/Body | d1, 22 | |
| Nivo (q3w) + Ipi | イピリムマブ | 点滴 | 1mg/kg | d1 | 42日 |
| | シスプラチン | 点滴 | 80mg/m ² | d1 | |
| FP | フルオロウラシル | 点滴 | 800mg/m ² | d1 - 5 | 28日 |
| | シスプラチン | 点滴 | 80mg/m ² | d1 | |
| NAC FP | フルオロウラシル | 点滴 | 800mg/m ² | d1 - 5 | 21日 |
| | シスプラチン | 点滴 | 70mg/m ² | d1 | |
| RT併用 FP | フルオロウラシル | 点滴 | 700mg/m ² | d1 - 4 | 28日 |
| | シスプラチン | 点滴 | 90mg/m ² | d1 | |
| CDGP + 5-FU | フルオロウラシル | 点滴 | 800mg/m ² | d1 - 5 | 28日 |
| | ネダプラチン | 点滴 | 800mg/m ² | d1 | |
| DTX | ドセタキセル | 点滴 | 70mg/m ² | d1 | 21日 |
| DTX + CDGP | ドセタキセル | 点滴 | 30mg/m ² | d1 | |
| | ネダプラチン | 点滴 | 40mg/m ² | d1 | 14日 |
| DCF | ドセタキセル | 点滴 | 70mg/m ² | d1 | |
| | シスプラチン | 点滴 | 70mg/m ² | d1 | 21日 |
| | フルオロウラシル | 点滴 | 750mg/m ² | d1 - 5 | |
| mFOLFOX6 | オキサリプラチン | 点滴 | 85mg/m ² | d1 | |
| | レボホリナート | 点滴 | 200mg/m ² | d1 | |
| | フルオロウラシル (急速) | 点滴 | 400mg/m ² | d1 | 14日 |
| | フルオロウラシル (持続) | 点滴 | 2400mg/m ² | d1 - 3 | |
| Nivo (q2w) | ニボルマブ | 点滴 | 240mg/Body | d1 | 14日 |
| Nivo (q4w) | ニボルマブ | 点滴 | 480mg/Body | d1 | 28日 |