

レジメン名称	薬剤名	投与経路	投与量	投与日	1クール日数
EC	エピルビシン	点滴	100mg/m ²	d1	21日
	シクロホスファミド	点滴	600mg/m ²	d1	
TC	ドセタキセル	点滴	75mg/m ²	d1	21日
	シクロホスファミド	点滴	600mg/m ²	d1	
T-mab+TC	トラスツズマブ	点滴	*1) 8mg/kg→6mg/kg	d1	21日
	ドセタキセル	点滴	75mg/m ²	d1	
	シクロホスファミド	点滴	600mg/m ²	d1	
DTX	ドセタキセル	点滴	75mg/m ²	d1	21日
T-mab+DTX	トラスツズマブ	点滴	*1) 8mg/kg→6mg/kg	d1	21日
	ドセタキセル	点滴	75mg/m ²	d1	
Pertuzumab+T-mab +DTX	ペルツズマブ	点滴	*2) 840mg/Body→420mg/Body	d1	21日
	トラスツズマブ	点滴	*1) 8mg/kg→6mg/kg	d1	
	ドセタキセル	点滴	75mg/m ²	d1	
PTX	パクリタキセル	点滴	80mg/m ²	d1,d8,d15	28日
VNR	ビノレルビン	点滴	25mg/m ²	d1,d8	21日
CPT-11	イリノテカン	点滴	100mg/m ²	d1,d8,d15	28日
GEM	ゲムシタビン	点滴	1250mg/m ²	d1,d8	21日
nab-PTX	nab-パクリタキセル	点滴	260mg/m ²	d1	21日
T-mab+nab-PTX	トラスツズマブ	点滴	*1) 8mg/kg→6mg/kg	d1	21日
	nab-パクリタキセル	点滴	260mg/m ²	d1	
Atezo+nab-PTX	アテゾリズマブ	点滴	840mg/Body	d1,15	28日
	nab-パクリタキセル	点滴	100mg/m ²	d1,d8,d15	
Eribulin	エリブリン	点滴	1.4mg/m ²	d1,8	21日
T-mab+Eribulin	トラスツズマブ	点滴	*1) 8mg/kg→6mg/kg	d1	21日
	エリブリン	点滴	1.4mg/m ²	d1,d8	
Bev+PTX	ベバシズマブ	点滴	10mg/kg	d1,d15	28日
	パクリタキセル	点滴	90mg/m ²	d1,d8,d15	
カドサイラ	トラスツズマブエムタンシン	点滴	3.6mg/kg	d1	21日
T-mab	トラスツズマブ	点滴	*1) 8mg/kg→6mg/kg	d1	21日
T-mab+PTX	トラスツズマブ	点滴	8mg/kg	d1	28日
	パクリタキセル	点滴	80mg/m ²	d1,d8,d15	
T-mab+VNR	トラスツズマブ	点滴	*1) 8mg/kg→6mg/kg	d1	21日
	ビノレルビン	点滴	25mg/m ²	d1,d8	
T-mab+GEM	トラスツズマブ	点滴	*1) 8mg/kg→6mg/kg	d1	21日
	ゲムシタビン	点滴	1200mg/m ²	d1,d8	
エンハーツ	トラスツズマブデルクステカン	点滴	5.4mg/kg	d1	21日

*1)初回は8mg/kg、2回目以降は6mg/kg。ただし、前回投与から4週間以上空いた場合は、8mg/kgとなる。

*2)初回は840mg/Body、2回目以降は420mg/Body。ただし、前回投与から6週間以上空いた場合は、840mg/Bodyとなる。